


ALBATROS-TOURS

ORNITHOLOGISCHE STUDIENREISEN

Jürgen Schneider

Altengassweg 13 - 64625 Bensheim - Tel.: +49 (0) 62 51 22 94 - Fax: +49 (0) 62 51 64 457
E-Mail: schneider@albatros-tours.com - Homepage: www.albatros-tours.com



Namibia


vom 15.11.09 – 28.11.2009

Reisebericht von Dr. Klaus Gerdes
& Bericht von Albert Voigts



Zwei kämpfende Bergzebras

Foto: Jürgen Schneider



Transfer; Bootsfahrten; englischsprachige Führung; Eintrittsgelder soweit im Reiseplan aufgeführt; Reise-Rücktrittskosten-Versicherung (83,- € / 124,- €); Sicherungsschein.

Im Reisepreis nicht enthalten: Visa ((Simbabwe ca. 35,- US\$ und Sambia (Tagesvisa) ca. 15 US\$), diese werden an der Grenze ausgestellt.

Teilnehmer: ab 1 Personen	März	Okt.
22. - 23. Tag in der Chobe Game Lodge		
Reisepreis: Doppelzimmer	2.580,- €	3.640,- €
EZ-Zuschlag	1.110,- €	1.110,- €
22. - 23. Tag in der Chobe Safari Lodge		
Reisepreis: Doppelzimmer	2.295,- €	3.120,- €
EZ-Zuschlag	1.110,- €	1.110,- €

Die Vogelwelt Namibias

Namibia

vom 13.11.09 bis 28.11.2009 Reise-Nr. 1379

Kontrastreiche Landschaften aus Wüste, Steppe, Küste, Buschland und Gebirge, eine sehr gute Infrastruktur und eine artenreiche Fauna und Avifauna machen Namibia zu einem der beliebtesten Reiseziele für Vogelbeobachter, Tierbeobachter und Fotografen in Afrika. Allein ca. 630 Vogelarten wurden hier nachgewiesen. Der Etoscha Nationalpark ist einer der wichtigsten Nationalparks in Afrika. Auf 22.270 qkm wurden hier über 140 Säugetierarten beobachtet.

Auf unserer 16-tägigen Reise besuchen wir mit der Namibwüste, der Walvis Bay, den Erongobergen (Spitzkopje), dem Etoscha Nationalpark und dem Okavango die ornithologisch wichtigsten Gebiete des Landes. Wir haben dort gute Chancen, viele der speziellen Arten in der Avifauna des Landes zu sehen wie Rüppelltrappe, Hartlaubfrankolin, Steppenbaumhopf, Rosenpapagei, Dünenlerche, Damara Felsenspringer, Namibschnäpper, Namiblerche, Layards-Meisensänger, Drosselwürger, Dunkler Drossling, Monteirotoke, Nacktohrdrossling, Damaratoko und Benguela Langschnabellerche.

Hobatero und Onguma bieten alle Lebensräume des Etoscha Nationalparks, allein hier wurden schon über 300 Arten dokumentiert. Verschiedene Exkursionen führen uns durch Wüsten, Sumpfgebiete, Trockenflüsse, Flüsse, Akaziensavannen, Grassteppen und Trockenwälder, zur Atlantikküste und bis zum Grenzfluss Kunene.

1. Tag: Abflug ab Frankfurt.

2. Tag: Ankunft in **Windhoek** und Transfer zur Unterkunft. In der Innenstadt zeigen wir Ihnen die wichtigsten Gebäude anhand einer Express – Stadtrundfahrt.

Am Nachmittag starten wir zu einer kleinen Wanderung um den **Avis Stausee**, der seinen Namen nicht umsonst bekommen hat. Das Wasser bietet zwar einen idealen Lebensraum für **Zwergtaucher**, **Pelikane**, verschiedene **Reiher** und **Kormorane**, wir stöbern aber entlang der Felswände und **Akaziensavanne** nach einigen Endemiten – **Monteiotoko** und **Damara-Felsenspringer**, auch **Klippensänger** genannt, sollen beobachtet werden.

3. + 4. Tag: Früher Start. Die Piste verläuft durch die malerische **Geröll-Namib**. Interessante Vögel unterwegs sind die endemischen **Namiblerchen** und **Wüstenschmätzer**, welche nur sehr schwierig aufgrund ihrer sehr guten Tarnung aufzuspüren sind. Zur Linken hat man ständig wechselnde Ausblicke auf die steil aufsteigenden Gebirgszüge der westlichen Randstufe, welche gute Chancen auf **Zimtbrustsänger** bieten. Auf dem Wege besichtigen wir die große, rund 1.500 Jahre alte "**Welwitschia mirabilis**", eine endemische Urpflanze, sehen ausgedehnte und vielseitige **Flechtenfelder**, die wild zerklüftete „Mondlandschaft“ und durchqueren den **Swakop-Trockenfluss** – vielleicht finden wir ja hier den **Langschwanz-Eremomela**. Wir entdecken hier auch regelmäßig die **Benguela Langschnabellerche**.

In den **Salzpfannen** sind große Ansammlungen von **Flamingos** und **Zwergflamingos**, zwischen denen **Säbelschnäbler**, **Stelzenläufer**, **Pfuhlschnepfen**, **Sanderlinge**, **Zwergstrandläufer**, **Kiebitzregenpfeifer**, **Steinwälder**, **Schwarze Austernfischer**, **Sichelstrandläufer** und **Knutt** sowie die endemische **Damara Seeschwalbe** zu finden sind.

Eine kurze Fahrt in die Dünenlandschaft des **Kuisebdelta** bei **Rooibank** wird oft mit **Oranjebrillenvogel** und dem markanten **Bokmakierie** belohnt. Hier wartet der Vogel Namibias auf uns, die **Dünenlerche**. Die „schön Singende mit dem roten Mäntelchen“ ist der einzig 100%ige Endemit Namibias.

5. + 6. Tag: Früh geht es wieder los. Nach einer kurzen Fahrt erreichen wir die **Spitzkopje**; die granitene Felsen der »Zwillingswachen« sind Namibias Botschafter und die Beschützer der Wüste. Hier ist einer der besten Plätze, um die endemischen **Namibschnäpper** und **Drosselwürger** neben **Layards-Meisensänger**, **Augurbussard**, **Zwergadler**, **Bergschmätzer** und **Drosselschnäpper** zu sehen.

Etwas weiter tauchen wir in die gewaltigen Granitlandschaften des Erongo ein. "**Die Ameib Ranch im Erongo Gebirge**", dort wo der **Erongo** am schönsten ist.

Dieses "grüne Paradies" inmitten einer kargen Granitlandschaft ist die Heimat verschiedener endemischer Vogelarten. Zwischen den Gesteinen sind interessante Pflanzen zu entdecken, und man kann sich an den gigantisch aufgetürmten Granitkugeln kaum satt sehen – Die **Bulls Party** ist immerhin die bekannteste Granitlandschaft Namibias. Eine Wanderung durch das Gelände endet an



Strichelracke

Foto: J. Schneider



Riesenentrappe

Foto: J. Schneider

der "Phillips Höhle". In der **Phillips Höhle** sind sehr deutliche uralte Felsmalereien, unter anderem auch der berühmte "weiße Elefant", zu finden. Die Vogelwelt in den Akazienbeständen dieses großen Gebirges scheint in ihrer Vielfalt keine Grenzen zu haben und das Geschnatter der *Hornvögel* schallt laut durch die Luft. *Felsenadler*, *Zwergadler*, *Augurbussard* und der afrikanische *Habichtsadler* nutzen die Bergwinde, hier Ihre Beute zu jagen. In der Lodge trinken täglich hunderte *Rosenköpchen*, und *Drosselwürger* gelten hier schon als alltäglich. Unsere besten Beobachtungen der endemischen *Hartlaub Frankoline* hatten wir bisher auf Ameib.

7. + 8. Tag: Eine lange Strecke bringt uns zu einem Naturschutzgebiet an der Westseite des **Etosha Nationalparks**. Unterwegs kurze Stopps, wir suchen den „schwierigsten Vogel Namibias, den *Namibschnäpper*.

Wir treffen auf eine unberührte Wildnis, wo *Elefanten*, *Löwen* und viele andere Tiere noch dem alltäglichen Rhythmus Afrikas folgen können. In diesem Wildschutzgebiet hat man das Vorrecht, diese »echte Natur« als Gast zu genießen. Es könnte durchaus vorkommen, einem *Elefanten* am Pool zu begegnen oder des nachts nicht nur *Eulen*, sondern auch *Löwen* zu hören. Hier sind Begegnungen mit den endemischen *Hartmann Bergzebras* und vielen seltenen Vogelarten zu erwarten.

In der Lodge nehmen wir an zwei Tages- und einer Nachtpirschfahrt in offenen Geländefahrzeugen teil und am Morgen steht eine Vogelpirsch auf dem Programm; *Rüppellmeise*, *Zwergohreule*, *Rothals-* und *Lannerfalke*, *Schwalbenschwanz-Bienenfresser*, *Doppelbandrennvogel*, *Russnektarvogel*, *Nacktohrdrossling*, *Damaratoko*, *Bindensänger* und *Bradfieldlerchen* werden oft nachgewiesen. Das Gebiet wimmelt von interessanten Vogelarten.

9. Tag: Um den seltenen *Cinderella Schönbürzel* zu finden, müssen wir nach **Ruacana** an den nordwestlichen Grenzfluss Namibias, den **Kunene**. Hier erwarten wir auch *Nacktkehlfrankolin* und *Graufalke* (wenn wir großes Glück haben), *Palmenrötel* und einige *Wasservögel*.

Auf Wunsch könnten wir kurz in einem **Himbadorf** halten, um einen Einblick in die Kultur dieses Hirtenvolks zu bekommen.

10. + 11. Tag: Eine recht lange Fahrtstrecke bringt uns in den vogelreichen Nordosten des Etosha Nationalparks. Etosha umfasst eine Fläche von über 22.000 qkm und wurde bereits 1907 von der Deutsch-Südwestafrikanischen Verwaltung zum Wildschutzgebiet erklärt. Im Zentrum liegt eine ausgedehnte *Salzpfanne*, umgeben von *Gras-* und *Dornsavannen*, *Mopane-Buschland* im Westen sowie *Trockenwald* im Nordosten. Die Pfanne ist nahezu immer trocken. Besonders im südlichen Teil des Parks

liegen jedoch verstreut zahlreiche Wasserlöcher, Lebensgrundlage für den Wildbestand im Etosha National Park. Nahezu die gesamte Palette an afrikanischem Großwild ist im Park vertreten und natürlich *Giraffe*, *Streifengnu*, *Steppenzebra*, *Oryx*, *Elefant*, *Nashorn*, *Löwe*, *Leopard* und *Gepard*. Aber auch seltene Arten wie *Bergzebra*, *Spitzmaulnashorn* und *Damara Dik Dik* werden immer wieder gesehen. Über 320 Vogelarten wurden nachgewiesen, darunter *Häher*-, *Schwarz*-, *Jakobiner*-, *Kap-* und *Afrikanischer Kuckuck*, *Riesentrappe*, *Zwergfalke*, *Gabarhabicht*, *Paradieskranich*, *Rostwangen-Nachtschwalbe*, *Goldbugpapagei*, *Dunkler Drossling*, *Elfenastrild*, *Rotbackensänger* und *Kapbeutelmeise*.

12. + 13. Tag: Nach viel trockenem Buschland in Form von *Akaziensavannen* und *Trockenwäldern*, kommen wir an das Tor in den Norden. Namibias Norden ist wegen der strengen Ausfuhrbestimmungen durch einen Veterinärszaun von der aktiven Landwirtschaft im zentralen und südlichen Namibia getrennt. Sobald man den Zaun hinter sich lässt, fängt ein Teil "Bilderbuchafrika" an.

Man sieht die ersten traditionellen Hütten, bekommt den Rauch der Eingeborenenfeuer in die Nase, Hühner und Rinder kreuzen die Strasse und man bemerkt wie die Vegetation immer dichter wird. Nach langer Fahrt stoßen wir endlich auf Wasser...der **Okavango** tut sich vor uns auf. Wir verlassen den Staub und betreten das Land der hohen Bäume und der *Krokodile*. Der **Caprivizipfel** wartet auf uns.

So komisch es auch klingt verbringen wir etwas Zeit an den Reinigungsanlagen **Rundus**, denn das kleine Watgebiet liefert herrliche Resultate. *Schieferschnäpper*, *Kapralle* *Sumpfbuschsänger*, *Hottentottenenten*, *Klaffschnäbel*, *Gartenrohrsänger* und *Angola-Mönchskuckuck* können hier erwartet werden.

Unterwegs halten wir des Öfteren an den dichten *Manketiwäldern* und halten Ausschau nach *Grünkappeneremomela*, *Spatelracke*, *Gelbkehlsperrlinge*, *Streifenliest*, *Damaratschagra*, *Felsentoko* und *Fahlschnäpper*.

Am nächsten Tag besichtigen wir den **Mahango Nationalpark**. Obwohl der Park nicht sehr groß ist, findet man dort sehr interessante *Rappen-* und *Pferdeantilopen*, natürlich *Giraffen* und oft *Elefanten*, *Litschi-Moorantilopen*, *Wasserböcke* und auch *Rietböcke* an den Ufern des **Okavango**. Der majestätische *Schreiseeadler* imponiert mit seinem Ruf und bemerkenswertem Aussehen.

Da wir hier in einem völlig neuen Habitat nach Vögeln Ausschau halten, füllen sich die Listen sehr schnell mit verschiedenen *Bienenfressern*, *Eisvögeln*, *Tauben*, *Staren*, *Reihern* und *Würgern*. Fast immer wird der *Luapula Zistensänger* gesehen. Auch werden hier häufig *Rotbauchreiher*, *Weißbrücken-Nachtreiher*, *Band-Schlängenschnäpper*, *Scherenschnabel* und *Goldschnepfe* gefunden. Da



Elefant

Foto: J. Schneider

die *Bindenfischeule* immer die Nummer eins unter den Vogelbeobachtungen bleibt und leider nur selten gesehen wird, werden wir auch am gegenüberliegenden Ufer des Okavango versuchen, diesen geheimnisvollen Vogel zu entdecken.

14. Tag: Bis auf kurze Stopps und etwas „roadside birding“ fahren wir durch bis an den **Waterberg**.

Die fünf Vegetationsstufen dieses markanten Sandsteinplateaus bieten wunderbare Wandermöglichkeiten. Die bunte Vogelwelt, die hautnahen Begegnungen mit *Bärenpavianen*, *Klippschliefern* und *Zwergrüsselantilopen* hinterlassen hier unvergessliche Eindrücke.

Der Waterberg ist das einzig mir bekannte Gebiet, wo man *Rüppel-* und *Goldbugpapageien* zusammen in einem Baum antreffen könnte. Immer wieder tauchen schnell zwischen der dichten Vegetation auch *Graurücken-Camaroptera*, *Kurzschwanz-Sylvietta*, *Gelbbaucheremomela* und andere sehr kleine Vögel auf.

15. Tag: Fahrt nach Windhoek – evtl. noch kurze Stopps.

16. Tag: Transfer zum Flughafen und Rückflug.

Im Reisepreis enthalten: Flug; Übernachtung inkl. 3. bis 14. Tag Halbpension (2. + 15. Tag nur Frühstück); Fahrt- und Führungskosten; deutschsprachige Reiseleitung; Eintrittsgelder laut Reiseplan; Reiseleitung; Reise-Rücktrittskosten-Versicherung (119,- €); Sicherungsschein.

Teilnehmer: maximal 10, minimal 8 Personen

Reisepreis: Doppelzimmer 3.320,- €

EZ-Zuschlag 380,- €

Diese Tour kann auch ab 2 Personen organisiert werden.

Gabun


vom 02.02.09 bis 17.02.2009 Reise-Nr. 1380

vom 29.08.09 bis 13.09.2009 Reise-Nr. 1381

vom 31.01.10 bis 15.02.2010 Reise-Nr. 1382

Diese Reise führt uns in eines der ornithologisch interessantesten afrikanischen Länder. Gabun ist 267.667 km² groß und besitzt mit 74 % der Landesfläche noch einen sehr hohen Anteil an ursprünglichem Regenwald. Bisher wurden in diesem Land 6.551 Arten Gefäßpflanzen, 190 Säuger-, 130 Reptilien- und ca. 670 Vogelarten registriert. Ca. 10 % des Landes sind in ca. 13 Nationalparks geschützt. Gabun gehört auf Grund seiner küstennahen Erdöl- und Erdgasvorkommen zu den wohlhabendsten afrikanischen Ländern. Noch ist dieses Land ein ausgesprochenes Geheimtipp für Naturbeobachter.

Auf einer 16tägigen Reise wollen wir die interessantesten Gebiete Gabuns, darunter das Lopé-Reservat, das Ipassa-Reservat und das Hochland besuchen mit Vorkom-



Nimmersatt & Krokodil

Foto: J. Schneider

men des Flachland-Gorillas und vieler endemischer Vogelarten. Zu den Besonderheiten zählen z.B.: Ansell-Kuckuck, Waldnachtschwalbe, Finsch Frankolin, Loango-weber, Schwarzperl- und Schlichthauben-Perlhuhn, Langschwanzhabicht, Saphirspint, Trugschwalbe, Kongoschmätzer, Schlangenbussard, Rachelweber, Buntkopffelshüpfer.

Auf der 7tägigen Verlängerungsreise erkunden wir die beiden kleinen vulkanischen Inseln Principe und Sao Tomé, die sich u.a. durch das Vorkommen von knapp 30 endemischen Vogelarten auszeichnen und ca. 250 km vor der afrikanischen Küste liegen. Diese ehemalige portugiesische Kolonie ist nur 1.001 km² groß. Noch 50 % der Inselflächen sind von Regenwald bedeckt.

1. Tag: Flug von Frankfurt in die Hauptstadt nach **Libreville**.

2. Tag: Fahrt durch Regenwaldgebiete in das **Lopé-Reservat**, wo wir 4x übernachten. Unterwegs suchen wir *Felsenbrachschnalbe*, *Hartlaubente*, *Binsenhuhn*, *Weißachsel-Brachschnalbe*, *Singschwalbe* und *Weißkopfkiebitz*.

3. - 5. Tag: Per Boot, Geländewagen und zu Fuß erkunden wir das **Lopé-Reservat**, in dem u.a. *Kaffernbüffel*, *Elefanten*, *Gorillas*, *Schimpansen* und viele interessante Vogelarten wie z.B. *Schwarzperlhuhn*, *Gabunbuschsänger*, *Waldnachtschwalbe*, *Blaubrust-* und *Purpurspint*, *Keulenhornvogel*, *Langschwanzhabicht*, *Maidtaube*, *Braunstirn-Regenpfeifer*, *Weißschopf-Hornvogel*, *Buntkopffelshüpfer*, *Leierschwanz-Honiganzeiger*, *Wassertriell*, *Halsband-Brachschnalbe*, *Violettmantel-*, *Grünkopf-Nektarvogel*, *Grünkehl-Glänzköpfchen*, *Gelbschnabel-Madenhacker*, *Blasskopfpinkpink*, *Braunrücken-* und *Gelbkehlpieper* vorkommen. Hier wurde die höchste Afendichte weltweit registriert. Das Gebiet ist sehr artenreich, da wir hier sehr viele unterschiedliche Lebensräume wie Gewässer mit Sand- und Felsenufern, Savannen, Galleriewälder und Regenwald antreffen können. Auf einer fakultativen Exkursion besteht die Möglichkeit, den gefährdeten *Flachland-Gorilla* zu suchen.

6. Tag: Fahrt auf schlechter Piste nach Osten zur **Stadt Makokou**, die am Rand des 10.000 ha großen **Ipassa-Reservates** liegt (4 Übernachtungen in sehr einfachem Hotel).

Dieses Regenwaldgebiet gilt als eines der wichtigsten Biodiversitätszentren für afrikanische Waldvögel! Auch hier leben *Tiefeland-Gorillas*.

7. - 9. Tag: In diesen drei Tagen erkunden wir vor allem den Regenwald zu Fuß auf Pfaden. Außerhalb des Reservates können wir im Kulturland auch Offenlandarten suchen. Das Beobachten im Regenwald ist mühselig und erfordert sehr viel Geduld und Konzentration. Viele Vögel leben in größeren, artenreichen Schwärmen. Dafür wer-

X = bis 10 Exempl. XX = bis 100 Exempl. XXX = bis 1.000 Exempl. XXXX = über 1.000 Exempl. Zahl = Anzahl der Art		(X) = Käfigvögel >/< = mehr als / weniger als ~ = ungefähr ? = nicht sicher bestimmt ruf = rufend		T = tot gefunden G = Gelege M/W = Männchen/Weibchen Kol. = Brutkolonie BP = brütende Paare													
		Flug		Küste		Hobatere		KR		Etoscha		Caprivi		Wa.		Flug	
		14.11.09	15.11.09	16.11.09	17.11.09	18.11.09	19.11.09	20.11.09	21.11.09	22.11.09	23.11.09	24.11.09	25.11.09	26.11.09	27.11.09	28.11.09	29.11.09
Namibia																	
STRUTHIONIFORMES: Struthionidae																	
Strauß (Ostrich) <i>Struthio camelus</i>																	
										X					X	X	
PODICIPEDIFORMES: Podicipedidae																	
Zwergtaucher (Little Grebe) <i>Tachybaptus ruficollis</i>																	
		X		X	X				X	X	X						X
PELECANIFORMES: Pelecanidae																	
Rosapelikan (Great White Pelican) <i>Pelecanus onocrotalus</i>																	
				X	X			X		X	X						X
Rötelpelikan (Pink-backed Pelican) <i>Pelecanus rufescens</i>																	
PELECANIFORMES: Phalacrocoracidae																	
Kormoran (Great Cormorant) <i>Phalacrocorax carbo</i>																	
	X			X	X												X
Kapscharbe (Cape Cormorant) <i>Phalacrocorax capensis</i>																	
				X													
Küstenscharbe (Bank Cormorant) <i>Phalacrocorax neglectus</i>																	
				X													
Riedscharbe (Long-tailed Cormorant) <i>Phalacrocorax africanus</i>																	
								X			X	X	X				X
Kronenscharbe (Crowned Cormorant) <i>Phalacrocorax coronatus</i>																	
				X													
PELECANIFORMES: Anhingidae																	
Schlangenhalsvogel (Darter) <i>Anhinga melanogaster</i>																	
												X	X				X
CICONIIFORMES: Ardeidae																	
Graureiher (Gray Heron) <i>Ardea cinerea</i>																	
	X			X	X			X		X	X						
Goliathreiher (Goliath Heron) <i>Ardea goliath</i>																	
												X	X				
Purpurreiher (Purple Heron) <i>Ardea purpurea</i>																	
									X				X				
Silberreiher (Great Egret) <i>Ardea alba</i>																	
									X			X	X				
Braunkehlreiher (Slaty Egret) <i>Egretta vinaceigula</i>																	
												X					
Glockenreiher (Black Heron) <i>Egretta ardesiaca</i>																	
									X								
Mittelreiher (Intermediate Egret) <i>Egretta intermedia</i>																	
												X					
Seidenreiher (Little Egret) <i>Egretta garzetta</i>																	
				X	X				X	X		X					X
Rallenreiher (Squacco Heron) <i>Ardeola ralloides</i>																	
									X	X		X	X				
Rotbauchreiher (Rufous-bellied Heron) <i>Ardeola rufiventris</i>																	
												X					
Kuhreiher (Cattle Egret) <i>Bubulcus ibis</i>																	
									X	X	X	X	X				X
Mangroveriher (Striated Heron) <i>Butorides striata</i>																	
									X		X	X	X				
Nachtreiher (Black-crowned Night-Heron) <i>Nycticorax nycticorax</i>																	
												X	X				X
Weißbrückenreiher (White-backed Night-Heron) <i>Gorsachius leuconotus</i>																	
												X					
Zwergdommel (Little Bittern) <i>Ixobrychus minutus</i>																	
																	X
CICONIIFORMES: Scopidae																	
Hammerkopf (Hamerkop)																	
	✓								✓	✓							✓

X = bis 10 Exempl.	(X) = Käfigvögel	T = tot gefunden																		
<i>Scopus umbretta</i>																				
CICONIIFORMES: Ciconiidae																				
Mohrenklaffschnabel (African Openbill) <i>Anastomus lamelligerus</i>																				
Schwarzstorch (Black Stork) <i>Ciconia nigra</i>																				
Wollhalsstorch (Woolly-necked Stork) <i>Ciconia episcopus</i>																				
Weißstorch (White Stork) <i>Ciconia ciconia</i>																				
Marabu (Marabou Stork) <i>Leptoptilos crumeniferus</i>																				
PHOENICOPTERIFORMES: Phoenicopteridae																				
Flamingo (Greater Flamingo) <i>Phoenicopterus roseus</i>																				
Zwergflamingo (Lesser Flamingo) <i>Phoenicopterus minor</i>																				
ANSERIFORMES: Anatidae																				
Gelbbrust-Pfeifgans (Fulvous Whistling-Duck) <i>Dendrocygna bicolor</i>																				
Witwenpfeifgans (White-faced Whistling-Duck) <i>Dendrocygna viduata</i>																				
Nilgans (Egyptian Goose) <i>Alopochen aegyptiaca</i>																				
Graukopfkasarka (South African Shelduck) <i>Tadorna cana</i>																				
Sporngans (Spur-winged Goose) <i>Plectropterus gambensis</i>																				
Glanzente (Comb Duck) <i>Sarkidiornis melanotos</i>																				
Fahlente (Cape Teal)/Kapente <i>Anas capensis</i>																				
Rotschnabelente (Red-billed Duck) <i>Anas erythrorhynchos</i>																				
Hottentottenente (Hottentot Teal) <i>Anas hottentota</i>																				
Kaplöffelente (Cape Shoveler) <i>Anas smithii</i>																				
Rotaugenente (Southern Pochard) <i>Netta erythrophthalma</i>																				
Afrikaruderente (Maccoa Duck) <i>Oxyura maccoa</i>																				
FALCONIFORMES: Accipitridae																				
Gleitaar (Black-shouldered Kite) <i>Elanus caeruleus</i>																				
Schwarzmilan (Black Kite) <i>Milvus migrans</i>																				
Schreiseeadler (African Fish-Eagle) <i>Haliaeetus vocifer</i>																				
Weißrückengeier (White-backed Vulture) <i>Gyps africanus</i>																				
Ohrengeier (Lappet-faced Vulture) <i>Torgos tracheliotus</i>																				
Schwarzbrust-Schlangenadler (Black-breasted Snake-Eagle) <i>Circaetus pectoralis</i>																				
Einfarb-Schlangenadler (Brown Snake-Eagle) <i>Circaetus cinereus</i>																				
Bandschlangenadler (Banded Snake-Eagle) <i>Circaetus cinerascens</i>																				
Gaukler (Bateleur) <i>Terathopus ecaudatus</i>																				
Froschweihe (African Marsh-Harrier) <i>Circus ranivorus</i>																				
Schmarotzermilan (Yellow-Billed-Kite) <i>Milvus parasitus</i>																				
Graubürzel-Singhabicht (Dark Chanting-Goshawk) <i>Melierax metabates/Weißbürzelsinghabicht</i>																				
Großer Singhabicht (Pale Chanting-Goshawk) <i>Melierax canorus</i>																				
Gabarhabicht (Gabar Goshawk) <i>Micronisus gabar</i>																				

X = bis 10 Exempl.	(X) = Käfigvögel	T = tot gefunden																
Schikrasperber (Shikra) <i>Accipiter badius</i>	X									X								
Mäusebussard (Eurasian Buzzard) <i>Buteo buteo vulpinus</i>	X					X		X	X					X				
Raubadler (Tawny Eagle) <i>Aquila rapax</i>								X	X					X	X			
Kaifernadler (Verreaux's Eagle)/Felsenadler <i>Aquila verreauxii</i>	X				X									X				
Afrikanischer Habichtsadler (African Hawk-Eagle) <i>Aquila spilogaster</i>	X																	
Kampfadler (Martial Eagle) <i>Polemaetus bellicosus</i>					X		X	X	X									
FALCONIFORMES: Sagittariidae																		
Sekretär (Secretary-bird) <i>Sagittarius serpentarius</i>						X												
FALCONIFORMES: Falconidae																		
Turmfalke (Eurasian Kestrel) <i>Falco tinnunculus</i>	X				X	X		X	X					X				
Steppenfalke (Greater Kestrel) <i>Falco rupicoloides</i>					X													
Rothalsfalke (Red-necked Falcon) <i>Falco chicquera</i>									X									
Amurfalke (Amur Falcon) <i>Falco amurensis</i>																		X
Lannerfalke (Lanner Falcon) <i>Falco biarmicus</i>	X																	
GALLIFORMES: Phasianidae																		
Schopffrankolin (Crested Francolin) <i>Francolinus sephaena</i>										X								
Hartlaubfrankolin (Hartlaub's Francolin) <i>Francolinus hartlaubi</i>						X												
Rotschnabelfrankolin (Red-billed Francolin) <i>Francolinus adspersus</i>	X				X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Rotkehlfrankolin (Red-necked Francolin) <i>Francolinus afer cuninensis</i>							X											
Swainsonfrankolin (Swainson's Francolin) <i>Francolinus swainsonii</i>								X		X	X							
GALLIFORMES: Numididae																		
Helmpferlhuhn (Helmeted Guineafowl) <i>Numida meleagris</i>	X			X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
GRUIFORMES: Gruidae																		
Paradieskranich (Blue Crane) <i>Grus paradisea</i>								X	X									
Klunkerkranich (Wattled Crane) <i>Bucconyx carunculatus</i>										X								
GRUIFORMES: Rallidae																		
Mohrensumpfhuhn (Black Crake) <i>Amaurornis flavirostris</i>							X	X			X	X						
Purpurhuhn (Purple Swamphen) <i>Porphyrio porphyrio</i>										X								X
Teichhuhn (Common Moorhen) <i>Gallinula chloropus</i>	X			X														X
Zwergteichhuhn (Lesser Moorhen) <i>Gallinula angulata</i>									X									
Kammbläßhuhn (Red-knobbed Coot) <i>Fulica cristata</i>	X			X					X	X								X
GRUIFORMES: Otididae																		
Riesentrappe (Kori Bustard) <i>Ardeotis kori</i>									X									
Ludwigtrappe (Ludwig's Bustard) <i>Neotis ludwigii</i>						X												
Rüppelltrappe (Rueppell's Bustard) <i>Eupodotis rueppellii</i>			X	X														
Rotschopftrappe (Red-crested Bustard) <i>Eupodotis ruficrista</i>							X											
Gackeltrappe (Black Bustard) <i>Eupodotis afra</i>									X									

X = bis 10 Exempl.	(X) = Käfigvögel	T = tot gefunden																	
CHARADRIIFORMES: Jacanidae																			
Blaustirn-Blathühnchen (African Jacana) <i>Actophilornis africanus</i>								X	X		X	X	X						X
CHARADRIIFORMES: Haematopodidae																			
Schwarzer Austernfischer (African Oystercatcher) <i>Haematopus moquini</i>				X															
CHARADRIIFORMES: Recurvirostridae																			
Stelzenläufer (Black-winged Stilt) <i>Himantopus himantopus</i>	X			X						X	X								
Säbelschnäbler (Pied Avocet) <i>Recurvirostra avosetta</i>				X						X	X								
CHARADRIIFORMES: Burhinidae																			
Wassertriel (Water Thick-knee) <i>Burhinus vermiculatus</i>								X					X						
Kaptriel (Spotted Thick-knee) <i>Burhinus capensis</i>	X						X												
CHARADRIIFORMES: Charadriidae																			
Langzehenkiebitz (Long-toed Lapwing) <i>Vanellus crassirostris</i>													X						
Schmiedekiebitz (Blacksmith Plover) <i>Vanellus armatus</i>	X			X	X	X	X		X		X	X	X	X	X	X			
Kronenkiebitz (Crowned Lapwing) <i>Vanellus coronatus</i>						X			X		X	X		X	X				
Senegalkiebitz (Wattled Lapwing) <i>Vanellus senegallus</i>												X							
Kiebitzregenpfeifer (Black-bellied Plover) <i>Pluvialis squatarola</i>				X								X							
Sandregenpfeifer (Common Ringed Plover) <i>Charadrius hiaticula</i>				X								X							
Hirtenregenpfeifer (Kittlitz's Plover) <i>Charadrius pecuarius</i>				X						X	X								
Dreiband-Regenpfeifer (Three-banded Plover) <i>Charadrius tricollaris</i>	X			X						X	X	X	X			X			
Weißstirn-Regenpfeifer (White-fronted Plover) <i>Charadrius marginatus</i>				X	X														
Rotband-Regenpfeifer (Chestnut-banded Plover) <i>Charadrius pallidus</i>				X															
CHARADRIIFORMES: Scolopacidae																			
Afrikanische Bekassine (African Snipe) <i>Gallinago nigripennis</i>									X										
Pfuhlschnepfe (Bar-tailed Godwit) <i>Limosa lapponica</i>				X															
Regenbrachvogel (Whimbrel) <i>Numenius phaeopus</i>				X	X														
Teichwasserläufer (Marsh Sandpiper) <i>Tringa stagnatilis</i>										X	X								
Grünschenkel (Common Greenshank) <i>Tringa nebularia</i>	X			X	X					X	X	X	X						X
Bruchwasserläufer (Wood Sandpiper) <i>Tringa glareola</i>	X			X			X			X		X							
Flußuferläufer (Common Sandpiper) <i>Actitis hypoleucos</i>	X			X						X		X							
Steinwälzer (Ruddy Turnstone) <i>Arenaria interpres</i>				X								X							
Sanderling (Sanderling) <i>Calidris alba</i>				X															
Zwergstrandläufer (Little Stint) <i>Calidris minuta</i>				X	X					X	X								
Sichelstrandläufer (Curlew Sandpiper) <i>Calidris ferruginea</i>				X	X							X							
Kampfläufer (Ruff) <i>Philomachus pugnax</i>				X						X	X								
Odinshühnchen (Red-necked Phalarope) <i>Phalaropus lobatus</i>				X															
CHARADRIIFORMES: Laridae																			
Dominikanermöwe (Kelp Gull) <i>Larus dominicanus</i>				X	X														
Graukopfmöwe (Gray-headed Gull)				✓															

X = bis 10 Exempl.	(X) = Käfigvögel	T = tot gefunden																		
<i>Larus cirrocephalus</i>		X																		
Hartlaubmöwe (Hartlaub's Gull) <i>Larus hartlaubii</i>		X	X																	
CHARADRIIFORMES: Sternidae																				
Raubseeschwalbe (Caspian Tern) <i>Sterna caspia</i>			X																	
Brandseeschwalbe (Sandwich Tern) <i>Sterna sandvicensis</i>			X																	
Eilseeschwalbe (Great Crested Tern) <i>Sterna bergii</i>			X																	
Flußseeschwalbe (Common Tern) <i>Sterna hirundo</i>			X	X																
Damaraseeschwalbe (Damara Tern) <i>Sterna balaenarum</i>			X	X	X															
CHARADRIIFORMES: Rynchopidae																				
Afrikanischer Scherenschnabel (African Skimmer) <i>Rynchops flavirostris</i>											X	X	X							
PTEROCLIFORMES: Pteroclididae																				
Namaflughuhn (Namaqua Sandgrouse) <i>Pterocles namaqua</i>				X		X														
Nachtflughuhn (Double-banded Sandgrouse) <i>Pterocles bicinctus</i>				X		X														
COLUMBIFORMES: Columbidae																				
Felsentaube (Rock Pigeon)/Straßentaube <i>Columba livia</i>	X			X																
Guineataube (Speckled Pigeon) <i>Columba guinea</i>	X		X		X															
Turteltaube (Turtle-Dove) <i>Streptopelia turtur</i>				X	X		X													
Brillentaube (African Mourning Dove) <i>Streptopelia decipiens</i>										X	X	X								
Halbmomdtaube (Red-eyed Dove) <i>Streptopelia semitorquata</i>											X	X								
Gurrtäube (Cape Turtle-Dove) <i>Streptopelia capicola</i>	X			X	X															
Palmtaube (Laughing Dove) <i>Streptopelia senegalensis</i>	X		X	X	X		X		X		X	X		X	X					
Bronzeflecktaube (Emerald-spotted Wood-Dove) <i>Turtur chalcospilos</i>	X								X		X									
Kapitäubchen (Namaqua Dove) <i>Oena capensis</i>	X			X	X	X	X		X		X	X								X
PSITTACIFORMES: Psittacidae																				
Rosenköpfchen (Rosy-faced Lovebird) <i>Agapornis roseicollis</i>	X																			X
Goldbugpapagei (Meyer's Parrot) <i>Poicephalus meyeri</i>												X								
Rüppellpapagei (Rueppell's Parrot) <i>Poicephalus rueppellii</i>	X						X												X	X
CUCULIFORMES: Musophagidae																				
Helmturako (Knysna Turaco) <i>Tauraco corythaix</i>					X															
Graulärmvögel (Gray Go-away-bird) <i>Corythaixoides concolor</i>	X			X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
CUCULIFORMES: Cuculidae																				
Jakobinerkuckuck (Pied Cuckoo) <i>Clamator jacobinus</i>									X	X									X	
Schwarzkuckuck (Black Cuckoo) <i>Cuculus clamosus</i>						X														
Goldkuckuck (Dideric Cuckoo) <i>Chrysococcyx caprius</i>													X							
Kupferschwanzkuckuck (Coppery-tailed Coucal) <i>Centropus cupreicaudus</i>										X										
Spornkuckuck (Senegal Coucal) <i>Centropus senegalensis</i>							X					X	X							
Tiputip (White-browed Coucal) <i>Centropus superciliosus</i>							X													
STRIGIFORMES: Tytonidae																				

X = bis 10 Exempl.	(X) = Käfigvögel	x	x	T = tot gefunden	x	x
<i>Upupa epops africanus</i>						
CORACIIFORMES: Phoeniculidae						
Baumhopf (Green Woodhoopoe) <i>Phoeniculus purpureus</i>					X	X
Steppenbaumhopf (Violet Woodhoopoe) <i>Phoeniculus damarensis</i>			X	X		
Sichelhopf (Common Scimitar-bill) <i>Rhinopomastus cyanomelas</i>				X	X	X
CORACIIFORMES: Bucerotidae						
Monteirutoko (Monteiro's Hornbill) <i>Tockus monteiri</i>				X	X	X
Rotschnabeltoko (Red-billed Hornbill) <i>Tockus erythrorhynchus</i>			X			X
Ostlicher Gelbschnabeltoko (Eastern Yellow-billed Hornbill) <i>Tockus flavirostris</i>			X		X	X
Südlicher Gelbschnabeltoko (Southern Yellow-billed Hornbill) <i>Tockus leucomelas</i>	X			X	X	X
Kronentoko (Crowned Hornbill) <i>Tockus alboterminatus</i>						
Felsentoko (Bradfield's Hornbill) <i>Tockus bradfieldi</i>					X	X
Grautoko (African Gray Hornbill) <i>Tockus nasutus</i>	X	X		X	X	X
PICIFORMES: Capitonidae						
Rotstirn-Bartvogel (Pied Barbet) <i>Tricholaema leucomelas</i>	X	X				
Halsband-Bartvogel (Black-collared Barbet) <i>Lybius torquatus</i>					X	X
PICIFORMES: Indicatoridae						
Nasenstreif-Honiganzeiger (Lesser Honeyguide) <i>Indicator minor</i>				X		
PICIFORMES: Picidae						
Goldschwanzspecht (Golden-tailed Woodpecker) <i>Campethera abingoni</i>				X		
PASSERIFORMES: Alaudidae						
Rotnackenlerche (Rufous-naped Lark) <i>Mirafra africana</i>				X	X	X
Ostklapperlerche (Eastern Clapper Lark) <i>Mirafra fasciolata</i>					X	
Sabotalerche (Sabota Lark) <i>Calendulauda sabota</i>	X				X	
Steppenlerche (Fawn-colored Lark) <i>Calendulauda africanoides</i>					X	X
Rotdünenlerche (Dune Lark) <i>Calendulauda erythrochlamys</i>			X			
Benguela-Langschnabellerche (Benguela Lark) <i>Certhilauda benguelensis</i>			X			
Zirplerche (Spike-heeled Lark) <i>Chersomanes albofasciata</i>		X				
Graurückenlerche (Gray-backed Sparrow-Lark) <i>Eremopterix verticalis</i>		X				
Namiblerche (Gray's Lark) <i>Ammomanopsis grayi</i>			X			
Rotkappenlerche (Red-capped Lark) <i>Calandrella cinerea</i>					X	X
Rotschnabellerche (Pink-billed Lark) <i>Spizocorys conirostris</i>					X	
Amernlerche (Sclater's Lark) <i>Spizocorys sclateri</i>	X					
Fablerche (Stark's Lark) <i>Spizocorys starki</i>		X				
PASSERIFORMES: Hirundinidae						
Weißbrauen-Uferschwalbe (Banded Martin) <i>Riparia cincta</i>					X	X
Graubürzelschwalbe (Gray-rumped Swallow) <i>Pseudhirundo griseopyga</i>						X
Steinschwalbe (Rock Martin) <i>Ptyonoprogne fuligula</i>	X					

X = bis 10 Exempl.	(X) = Käfigvögel	T = tot gefunden														
Rauchschwalbe (Barn Swallow) <i>Hirundo rustica</i>							X		X			X		X		
Rotkappenschwalbe (Wire-tailed Swallow) <i>Hirundo smithii</i>											X					
Perlbrustschwalbe (Pearl-breasted Swallow) <i>Hirundo dimidiata</i>					X											
Kapschwalbe (Greater Striped-Swallow) <i>Cecropis cucullata</i>	X															
Maidschwalbe (Lesser Striped-Swallow) <i>Cecropis abyssinica</i>					X							X		X		
Rotbrustschwalbe (Rufous-chested Swallow) <i>Cecropis semirufa</i>							X	X				X				
Senegalschwalbe (Mosque Swallow) <i>Cecropis senegalensis</i>								X				X				
PASSERIFORMES: Motacillidae																
Witwenstelze (African Pied Wagtail) <i>Motacilla aguimp</i>												X	X			X
Kapstelze (Cape Wagtail) <i>Motacilla capensis</i>	X		X	X	X									X	X	
Schafstelze (Yellow Wagtail) <i>Motacilla flava</i>									X							
Waldlandpieper (Woodland Pipit) <i>Anthus nyassae</i>												X				
Vaalpieper (Buffy Pipit) <i>Anthus vaalensis</i>														X		
Zimtspornpieper/Weidelandpieper (African Pipit) <i>Anthus cinnamomeus</i>							X	X								
Langschnabelpieper (Long-billed Pipit) <i>Anthus similis</i>														X		
PASSERIFORMES: Pycnonotidae																
Graubülbül (Common Bulbul) <i>Pycnonotus barbatus</i>											X	X	X		X	
Maskenbülbül (Black-fronted Bulbul) <i>Pycnonotus nigricans</i>	X		X						X							X
Gelbbauchbülbül (Yellow-bellied Greenbul) <i>Chlorocichla flaviventris</i>							X	X				X				
PASSERIFORMES: Turdidae																
Kurzzeheerötel (Short-toed Rock-Thrush) <i>Monticola brevipes</i>			X				X									
Akaziendrossel (Groundscraper Thrush) <i>Psophocichla litsipsirupa</i>							X									X
PASSERIFORMES: Cisticolidae																
Rotscheitel-Cistensänger (Rattling Cisticola) <i>Cisticola chiniana</i>									X						X	
Rotschwanz-Cistensänger (Gray Cisticola) <i>Cisticola rufilatus</i>											X					
Schwarzrücken-Cistensänger (Winding Cisticola) <i>Cisticola galactotes</i>																
Lyneszistensänger (Luapula Cisticola) <i>Cisticola galactotes luapula</i>												X				
Cistensänger (Zitting Cisticola) <i>Cisticola juncidis</i>							X									
Kalaharicistensänger (Desert Cisticola) <i>Cisticola aridulus</i>			X	X		X			X						X	
Rahmbrustprinie (Tawny-flanked Prinia) <i>Prinia subflava</i>														X		
Brustbandprinie (Black-chested Prinia) <i>Prinia flavicans</i>	X		X	X	X	X										
Graurücken-Camaroptera (Green-backed Camaroptera) <i>Camaroptera brachyura</i>			X			X			X							
Damarabindensänger (Barred Camaroptera) <i>Calamonastes fasciolatus</i>									X							
PASSERIFORMES: Sylviidae																
Sumpfbuschsänger (African Bush-Warbler) <i>Bradypterus baboecala</i>											X					
Schilfrohrsänger (Sedge Warbler) <i>Acrocephalus schoenobaenus</i>												X				
Gartenrohrsänger (African Reed-Warbler) <i>Acrocephalus baeticatus</i>				X							X					X
Drosselrohrsänger (Great Reed-Warbler)									√							

X = bis 10 Exempl.	(X) = Käfigvögel	x	T = tot gefunden																
<i>Acrocephalus arundinaceus</i>																			x
Papyrusrohrsänger (Greater Swamp-Warbler)																			X
<i>Acrocephalus rufescens</i>																			
Gelbspötter (Icterine Warbler)																			
<i>Hippolais icterina</i>																			X
Gelbbauch-Eremomela (Yellow-bellied Eremomela)	X																		
<i>Eremomela icteropygialis</i>																			X
Graukappen-Eremomela (Greencap Eremomela)																			
<i>Eremomela scotops</i>																			
Langschwanz-Eremomela (Yellow-rumped Eremomela)																			
<i>Eremomela gregalis</i>																			X
Langschnabel-Sylvietta (Cape Crombec)																			
<i>Sylvietta rufescens</i>																			X
Fitis (Willow Warbler)																			
<i>Phylloscopus trochilus</i>																			X
Layard Meisensänger (Layard's Warbler)																			
<i>Parisoma layardi</i>																			X
Meisensänger (Rufous-vented Warbler)																			
<i>Parisoma subcaeruleum</i>																			X
PASSERIFORMES: Muscipidae																			
Fahlschnäpper (Pale Flycatcher)																			X
<i>Bradornis pallidus</i>																			
Drosselschnäpper (Chat Flycatcher)																			
<i>Bradornis infuscatus</i>																			X
Maricoschnäpper (Mariqua Flycatcher)	X																		
<i>Bradornis mariquensis</i>																			X
Grauschnäpper (Spotted Flycatcher)	X																		
<i>Muscicapa striata</i>																			X
Meisenschnäpper (Gray Tit-Flycatcher)																			
<i>Myioparus plumbeus</i>																			X
Weißbrauenrötel (White-browed Robin-Chat)																			
<i>Cossypha heuglini</i>																			X
Graubruströtel (Rufous-tailed Palm-Thrush)																			
<i>Cichladusa ruficauda</i>																			X
Weißbrauen-Heckensänger (Red-backed Scrub-Robin)																			
<i>Cercotrichas leucophrys</i>																			X
Kalahariheckensänger (Kalahari Scrub-Robin)																			
<i>Cercotrichas paena</i>																			X
Namibschnäpper (Herero Chat)																			
<i>Namibornis herero</i>																			X
Schwarzkehlchen (African Stonechat)																			
<i>Saxicola torquata</i>																			X
Bergschmätzer (Mountain Wheatear)	X																		
<i>Oenanthe monticola</i>																			X
Erdschmätzer (Capped Wheatear)	X																		
<i>Oenanthe pileata</i>																			
Bleichschmätzer (Karoo Chat)																			
<i>Cercomela schlegelii</i>																			X
Rostschwanz (Familiar Chat)	X																		
<i>Cercomela familiaris</i>																			X
Termitenschmätzer (Southern Anteater-Chat)																			
<i>Myrmecocichla formicivora</i>																			X
PASSERIFORMES: Platysteiridae																			
Weißflankenbatis (Chin-spot Batis)																			X
<i>Batis molitor</i>																			
Piritbatis (Pirit Batis)	X																		
<i>Batis pirit</i>																			
Drosselwürger (White-tailed Shrike)	X																		
<i>Lanioturdus torquatus</i>																			X
PASSERIFORMES: Monarchidae																			
Graubrust-Paradiesschnäpper (African Paradise-Flycatcher)																			
<i>Terpsiphone viridis</i>																			X
PASSERIFORMES: Timaliidae																			
Klippensänger (Damara Rockjumper/Rockrunner)	X																		
<i>Chaetops pycnopygius</i>																			X
Schwarzzügeldrossling (Black-faced Babbler)																			
<i>Turdoides melanops</i>																			X
Weißbüzeldrossling (Hartlaub's Babbler)																			
<i>Turdoides hartlaubii</i>																			X
Elsterdrossling (Southern Pied-Babbler)																			
<i>Turdoides bicolor</i>																			X

X = bis 10 Exempl.	(X) = Käfigvögel	T = tot gefunden																		
Braundrossling (Arrow-marked Babbler) <i>Turdoides jardineii</i>																				X
PASSERIFORMES: Paridae																				
Mohrenmeise (Southern Black-Tit) <i>Melaniparus niger</i>																				X
Carpmeise (Carp's Tit/Rüppel's Tit) <i>Melaniparus carpi</i>	X																			X
Akazienmeise (Ashy Tit) <i>Melaniparus cinerascens</i>																				X
PASSERIFORMES: Nectariniidae																				
Amethystglanzköpfchen (Amethyst Sunbird) <i>Chalcomitra amethystina</i>																				X
Rotbrust-Glanzköpfchen (Scarlet-chested Sunbird) <i>Chalcomitra senegalensis</i>																				X
Bindennektarvogel (Mariqua Sunbird) <i>Cinnyris mariquensis</i>	X																			X
Porphyrnektarvogel (Purple-banded Sunbird) <i>Cinnyris bifasciatus</i>																				X
Weißbauch-Nektarvogel (White-breasted Sunbird) <i>Cinnyris talatala</i>																				X
Rußnektarvogel (Dusky Sunbird) <i>Cinnyris fuscus</i>	X																			X
PASSERIFORMES: Zosteropidae																				
Senegalbrillenvogel (African Yellow White-eye) <i>Zosterops senegalensis</i>																				X
Kapbrillenvogel (Cape White-eye) <i>Zosterops pallidus</i>																				X
PASSERIFORMES: Oriolidae																				
Maskenpirol (African Black-headed Oriole) <i>Oriolus larvatus</i>																				X
PASSERIFORMES: Laniidae																				
Neuntöter (Red-backed Shrike) <i>Lanius collurio</i>																				X
Schwarzstirnwürger (Lesser Gray Shrike) <i>Lanius minor</i>																				X
Fiskalwürger (Common Fiscal) <i>Lanius collaris subcoronatus</i>	X																			X
Elsterwürger (Magpie Shrike) <i>Corvinella melanoleuca</i>																				X
Weißscheitelwürger (White-crowned Shrike) <i>Eurocephalus anguitemens</i>																				X
PASSERIFORMES: Malaconotidae																				
Brubru (Brubru) <i>Nilaus afer</i>	X																			X
Schneeballwürger (Black-backed Puffback) <i>Dryoscopus cubla</i>																				X
Dornschagra (Brown-crowned Tchagra) <i>Tchagra australis</i>																				X
Sumpfwürger (Gabon Boubou) <i>Laniarius bicolor</i>																				X
Rotbauchwürger (Crimson-breasted Gonolek) <i>Laniarius atrococcineus</i>	X																			X
PASSERIFORMES: Prionopidae																				
Brillenwürger (White Helmetshrike) <i>Prionops plumatus</i>																				X
Dreifarb-Brillenwürger (Retz's Helmetshrike) <i>Prionops retzii</i>																				X
PASSERIFORMES: Dicuridae																				
Trauerdrongo (Fork-tailed Drongo) <i>Dicurus adsimilis</i>																				X
PASSERIFORMES: Corvidae																				
Kapkrähe (Cape Crow) <i>Corvus capensis</i>																				X
Schildrabe (Pied Crow) <i>Corvus albus</i>																				X

X = bis 10 Exempl.	(X) = Käfigvögel	T = tot gefunden																	
PASSERIFORMES: Sturnidae																			
Lappenstar (Wattled Starling) <i>Creatophora cinerea</i>																			X
Rotschulter-Glanzstar (Cape Glossy-Starling) <i>Lamprotonis nitens</i>	X			X		X		X		X								X	X
Grünschwanz-Glanzstar (Greater Blue-eared Glossy-Starling) <i>Lamprotonis chalybaeus</i>													X						
Meves-Glanzstar (Meves's Glossy-Starling) <i>Lamprotonis mevesii</i>				X	X	X	X			X									
Riesenglanzstar (Burchell's Glossy-Starling) <i>Lamprotonis australis</i>						X	X			X	X	X							
Amethystglanzstar (Violet-backed Starling) <i>Cinnyricinclus leucogaster</i>									X	X		X							
Fahlflügelstar/Bergstar (Pale-winged Starling) <i>Onychognathus nabouroup</i>	X			X														X	
Gelbschnabel-Madenhacker (Yellow-billed Oxpecker) <i>Buphagus africanus</i>							X					X							
PASSERIFORMES: Ploceidae																			
Büffelweber (Red-billed Buffalo-Weaver) <i>Bubalornis niger</i>						X								X					
Schnurrbärtchen (Scaly Weaver) <i>Sporopipes squamifrons</i>		X																	
Mahaliweber (White-browed Sparrow-Weaver) <i>Plocepasser mahali</i>			X	X	X	X						X						X	
Brillenweber (Spectacled Weaver) <i>Ploceus ocularis</i>						X		X											
Safranweber (Holub's Golden-Weaver) <i>Ploceus xanthops</i>						X								X					
Maskenweber (Southern Masked-Weaver) <i>Ploceus velatus</i>			X						X			X						X	X
Maronenweber (Chestnut Weaver) <i>Ploceus rubiginosus</i>						X													
Scharlachweber (Red-headed Weaver) <i>Anaplectes rubriceps</i>						X		X				X							
Blutschnabelweber (Red-billed Quelea) <i>Quelea quelea</i>				X		X		X	X	X									
Oryxweber (Red Bishop) <i>Euplectes orix</i>																			X
Stummelwida (Fan-tailed Widowbird) <i>Euplectes axillaris</i>														X					
PASSERIFORMES: Estrildidae																			
Buntastrild (Green-winged Pytilia) <i>Pytilia melba</i>	X					X													
Braunbürzelamarant (Brown Firefinch) <i>Lagonosticta nitidula</i>												X	X						
Senegalamarant (Red-billed Firefinch) <i>Lagonosticta senegala</i>								X					X	X					
Blauastrild (Blue-breasted Cordonbleu) <i>Uraeginthus angolensis</i>						X	X					X	X	X					
Granatastrild (Violet-eared Waxbill) <i>Uraeginthus granatina</i>	X					X		X				X							
Cinderellaschönbürzel (Cinderella Waxbill) <i>Estrilda thomensis</i>						X													
Wellenastrild (Common Waxbill) <i>Estrilda astrild</i>			X			X	X					X	X						
Elfenastrild (Black-cheeked Waxbill) <i>Estrilda erythronotos</i>																		X	X
Rotkopfamadine (Red-headed Finch) <i>Amadina erythrocephala</i>				X	X				X									X	
PASSERIFORMES: Viduidae																			
Dominikanerwitwe (Pin-tailed Whydah) <i>Vidua macroura</i>																		X	
Schmalschwanz-Paradieswitwe (Eastern Paradise-Whydah) <i>Vidua paradisaea</i>													X						
PASSERIFORMES: Emberizidae																			
Lerchenammer (Lark-like Bunting) <i>Emberiza impetواني</i>	X		X	X															
Bergammer (Cinnamon-breasted Bunting) <i>Emberiza tahapisi</i>					X	X	X												
Kapammer (Cape Bunting)																			

X = bis 10 Exempl.	(X) = Käfigvögel	x	T = tot gefunden																
<i>Emberiza capensis</i>																			
Gelbbauchhammer (Golden-breasted Bunting)																			
<i>Emberiza flaviventris</i>																			
PASSERIFORMES: Fringillidae																			
Angolagirlitz (Black-throated Canary)																			
<i>Serinus atrogularis</i>	X																		
Mosambikgirlitz (Yellow-fronted Canary)																			
<i>Serinus mozambicus</i>																			
Gelbbauchgirlitz (Yellow Canary)																			
<i>Serinus flaviventris</i>																			
Weißkehlgirlitz (White-throated Canary)																			
<i>Serinus albogularis</i>	X																		
PASSERIFORMES: Passeridae																			
Hausperling (House Sparrow)																			
<i>Passer domesticus</i>																			
Rostperling (Great Rufous Sparrow)																			
<i>Passer motitensis</i>																			
Kapsperling (Cape Sparrow)																			
<i>Passer melanurus</i>	X																		
Graukopfsperling (Southern Gray-headed Sparrow)																			
<i>Passer diffusus</i>	X																		
Säugetiere																			
Tschakma-Pavian/Bergpavian (Chacma Baboon)																			
<i>Papio ursinus</i>	X																		
Buschhase (Scrubhare)																			
<i>Lepus saxatili</i>																			
Stachelschwein (Porcupine)																			
<i>Hystrix africaeaustralis</i>																			
Springhase (Springhaas)																			
<i>Pedetes capensis</i>																			
Erdhörnchen (Ground Squirrel)																			
<i>Xerus inauris</i>																			
Ockerfuß-Buschhörnchen (Tree Squirrel)																			
<i>Paraxerus cepapi</i>																			
Löwe (Lion)																			
<i>Panther leo</i>																			
Leopard (Leopard)																			
<i>Panther pardus</i>																			
Falbkatze (African Wild Kat)																			
<i>Felis lybica</i>																			
Löffelhund (Bat-Eared Fox)																			
<i>Otocyon megalotis</i>																			
Schabrackenschakal (Black-Backed Jackal)																			
<i>Canis mesomelas</i>																			
Kap Fingerotter (Cape Clawless Otter)																			
<i>Aonyx capensis</i>																			
Kleinflecken-Ginsterkatze (Small-Spotted Genet)																			
<i>Genetta genetta</i>																			
Fuchsmanguste (Yellow Mongoose)																			
<i>Cynictis penicillata</i>																			
Zebromanguste (Banded Mongoose)																			
<i>Mungos mungo</i>																			
Zwergmanguste (Dwarf Mongoose)																			
<i>Helogale parvula</i>																			
Afrikanischer Elefant (African Elephant)																			
<i>Loxodonta africana</i>																			
Klippschliefer (Rock Dassie)																			
<i>Vidua chalybeata</i>	X																		
Breitmaul-Nashorn (White Rhinoceros)																			
<i>Ceratotherium simum</i>																			
Spitzmaul-Nashorn (Black Rhinoceros)																			
<i>Diceros bicornis</i>																			
Steppenzebra (Burchell's Zebra)																			
<i>Epuus bruchelli</i>																			
Hartmanns Bergzebra (Hartmann's Mountain Zebra)																			
<i>Epuus zebra hartmannae</i>																			
Warzenschwein (Warthog)																			
<i>Phacochoerus aethopicus</i>	X																		

X = bis 10 Exempl.	(X) = Käfigvögel							T = tot gefunden							
Nilpferd (Hippopotamus) <i>Hippopotamus amphibius</i>										X	X				
Giraffe (Giraffe) <i>Giraffa camelopardalis</i>	X				X	X		X		X				X	
Weißschwanzgnu (Black Wildebeest) <i>Connochaetes gnou</i>								X		X				X	
Kuhantilope (Red Hartebeest) <i>Alcelaphus buselapalis</i>										X				X	
Kronenducker (Common Duiker) <i>Sylvicapra grimmia</i>	X							X							
Springbock (Springbok) <i>Antidorcas marsupialis</i>				X	X	X		X						X	
Damara Kirkdikdik (Damara Dikdik) <i>Madoqua kirkii</i>				X				X						X	
Steinbock (Steenbok) <i>Raphicerus campestris</i>														X	
Impala (Impala) <i>Aepyceros m. melampus</i>										X					
Schwarzgesicht-Impala (Black-Faced Impala) <i>Aepyceros melampus petersi</i>								X						X	
Oryx / Spießbock (Gemsbok) <i>Oryx gazella</i>					X	X		X		X				X	
Büffel (Buffalo) <i>Syncerus caffer</i>												X			
Kudu (Kudu) <i>Tragelaphus strepsiceros</i>	X				X	X		X		X	X				X
Buschbock (Bushbuck) <i>Tragelaphus scriptus</i>					X										
Elenantilope (Eland) <i>Taurotragus oryx</i>						X		X							